

แบบฟอร์มกำกับการใช้ยา botulinum A toxin

ข้อบ่งใช้ โรค spasmodic dysphonia

(รายละเอียดการใช้จ่ายโปรดอ้างอิงจากแนวทางกำกับการใช้ยาและคู่มือการใช้อย่างสมเหตุสมผลตามบัญชียาหลักแห่งชาติ)

ส่วนที่ 1 ข้อมูลผู้ป่วย

เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

1.ชื่อ-นามสกุล.....2.HN.....3.AN.....

4.เพศ ชาย หญิง 5.วัน/เดือน/ปี เกิด...../...../..... 6.อายุ.....ปี.....เดือน

7.เลขประจำตัวประชาชน 8.รหัสโรงพยาบาล.....

9.สิทธิการเบิก หลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า ประกันสังคม
สวัสดิการรักษายาบาลข้าราชการ อื่นๆ ระบุ.....

10.ได้รับ pre-authorization แล้ว ใช่ ไม่ใช่ 11.authorization number.....

ส่วนที่ 2 ข้อมูลประกอบการอนุมัติและข้อมูลการใช้ยา

แพทย์

ก.กรณีขออนุมัติการใช้ยาเป็นครั้งแรก วัน/เดือน/ปี ที่ใช้ยา...../...../.....

	ใช่	ไม่ใช่
1.ต้องไม่เป็นผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ในภาวะ terminally ill (ไม่อนุมัติการใช้ยาในผู้ป่วย terminally ill)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.ผู้ป่วยได้รับการตรวจวินิจฉัยว่าเป็นโรค spasmodic dysphonia ด้วยเกณฑ์ครบทุกข้อ ดังนี้		
2.1 ผู้ป่วยมีอาการของ โรค spasmodic dysphonia ชนิดใด ชนิดหนึ่ง ดังต่อไปนี้		
2.1.1 Adductor spasmodic dysphonia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.2 Abductor spasmodic dysphonia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.1.3 Mixed spasmodic dysphonia	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
มีทั้งอาการ Adductor spasmodic dysphonia และ Abductor spasmodic dysphonia		
2.2 ไม่พบความผิดปกติของสายเสียงจากภาวะอื่น	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
เช่น ก้อนเนื้อออก, การอักเสบของกล่องเสียง หรือความผิดปกติของข้อต่อ crico-arytenoid		
3.ขนาดยาที่ใช้ <input type="checkbox"/> Botox® ยูนิต (ขนาดยาที่แนะนำ เริ่มต้น 3 – 30 unit ต่อ 1 ครั้ง การรักษา		
<input type="checkbox"/> Dysport®.....ยูนิต (ขนาดยาที่แนะนำ เริ่มต้น 12 – 120 unit ต่อ 1 ครั้ง การรักษา		

ข.กรณีขออนุมัติการใช้ยาเป็นครั้งที่สอง วัน/เดือน/ปี ที่ใช้ยา...../...../.....

	ใช่	ไม่ใช่
1.ต้องไม่เป็นผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ในภาวะ terminally ill (ไม่อนุมัติการใช้ยาในผู้ป่วย terminally ill)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.การรักษาครั้งนี้ห่างจากครั้งแรกนานกว่า 3 เดือน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
วัน/เดือน/ปี ที่ใช้ยาครั้งแรก...../...../.....		
3.ระบุผลการรักษาครั้งก่อน ผู้ป่วยมีอาการดีขึ้น% (ประเมินที่ 4 – 6 สัปดาห์ หลังให้ยาก่อน)		
เปรียบเทียบวิธีที่ค้นการออกเสียงโดยแพทย์ ก่อน และหลังการรักษา ระบุผล.....		
4.ขนาดยาที่ใช้ <input type="checkbox"/> Botox® ยูนิต <input type="checkbox"/> Dysport®.....ยูนิต		
ขนาดยาสะสม <input type="checkbox"/> Botox® ยูนิต (ไม่เกิน 300 unit/ปี)		
<input type="checkbox"/> Dysport®.....ยูนิต (ไม่เกิน 1,000 unit/ปี)		

ค.กรณีขออนุมัติการใช้ยาเป็นครั้งที่สามเป็นต้นไป

วัน/เดือน/ปี ที่ใช้ยา...../...../.....

การใช้ยาครั้งนี้เป็นครั้งที่.....

	ใช่	ไม่ใช่
1.ต้องไม่เป็นผู้ป่วยในระยะสุดท้าย ในภาวะ terminally ill (ไม่อนุมัติการใช้ยาในผู้ป่วย terminally ill)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
2.ผู้ป่วยยังคงตอบสนองต่อการรักษา ซึ่งสมควรได้รับยาต่อ	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
3.การรักษาครั้งนี้ห่างจากครั้งแรกนานกว่า 3 เดือน	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>
วัน/เดือน/ปี ที่ใช้ยาครั้งแรก...../...../.....		
4.ขนาดยาที่ใช้ <input type="checkbox"/> Botox® ยูนิต <input type="checkbox"/> Dysport®.....ยูนิต		
ขนาดยาสะสม <input type="checkbox"/> Botox® ยูนิต (ไม่เกิน 300 unit/ปี)		
<input type="checkbox"/> Dysport®.....ยูนิต (ไม่เกิน 1,000 unit/ปี)		

ขอรับรองว่าข้อมูลข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ

.....

ลงนามแพทย์ผู้สั่งใช้ยา

(.....)

.....

เลขที่ใบประกอบโรคศิลปะ

วันที่...../...../.....

ผลการอนุมัติ

อนุมัติ

ไม่อนุมัติ

ลงนามแพทย์ผู้อนุมัติ.....

(.....)

ตำแหน่ง.....

วันที่...../...../.....

หมายเหตุ :

Adductor spasmodic dysphonia เป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อกล่องเสียง ในกลุ่มที่ทำหน้าที่ปิดสายเสียง และควบคุมการออกเสียง มีการทำงานมากกว่าปกติโดยควบคุมไม่ได้ ทำให้มีอาการ คือ เสียงคั้น ต้องออกแรงพูด(strain strangle voice) อาจจะมีเสียงไม่ออกเป็นช่วงๆทำให้เสียงพูดไม่ต่อเนื่อง ถ้ามีอาการมากอาจพูดไม่ออกเลย นอกจากนี้อาจมีเสียงสั่นด้วยได้ขณะหัวเราะหรือร้องเพลงเสียงสูง เสียงอาจกลับเป็นปกติหรือใกล้เคียงปกติได้

Abductor spasmodic dysphonia เป็นการเกร็งของกล้ามเนื้อกล่องเสียง ในกลุ่มที่ทำหน้าที่เปิดสายเสียง มีการทำงานมากกว่าปกติโดยควบคุมไม่ได้ ทำให้สายเสียงเปิดออกในขณะที่พูด มีอาการคือพูดแล้วเสียงเป็นลม(breathy voice) ซึ่งอาจเป็นตลอดเวลา หรือพูดต่อเนื่องมีเสียงลมรบกวนเป็นระยะก็ได้ ผู้ป่วยที่มีอาการมากอาจพูดเป็นเสียงเบา หรือเสียงกระซิบตลอดเวลา นอกจากนี้อาจมีเสียงสั่นด้วยได้ขณะหัวเราะหรือร้องเพลงเสียงสูง เสียงอาจกลับเป็นปกติ หรือใกล้เคียงปกติได้

Mixed spasmodic dysphonia มีอาการทั้ง Adductor spasmodic dysphonia และ Abductor spasmodic dysphonia เปลี่ยนไปมา